

	商品名	商品説明	効能・効果	用法・用量	成分・分量	使用上の注意	保管および取扱い上の注意		
日本語	胃健錠	胃酸過多、胸やけ、もたれ、飲みすぎなどの不快な症状は一刻も早く解消したいものです。胃健錠の第一の特徴はすばやいききめです。さらに胃を持続的に健全な状態に保ち、粘膜を被覆して刺激から保護します。配合された生薬が胃の活性化を助けます。	・胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（胃のむかつき、二日酔、悪酔のむかつき）、嘔吐、飲みすぎ、胃痛、食欲不振、食べ過ぎ	・次の量を食後30分を目安に、水又はお湯と一緒にかまずに服用してください。	6錠(大人の1日量)中		【してはいけないこと】 ① 次の人は服用しないでください。 透析療法を受けている人 ② 長期連用しないでください。 〔相談すること〕 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 次の診断を受けた人。腎臓病、甲状腺機能障害。 2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘、下痢 3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。	(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。 (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。 (5) 容器の中の詰め物は、ふたをあけた後は取り出して捨ててください(詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものです)。 2012年8月改訂 (記載要領変更に伴う改訂)	
				年齢	1回量	1日服用回数			成分
				成人(15歳以上)	2錠	3回	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	300mg	胃内の酸度を安定させ、胃の粘膜に被覆をつくります。
				11歳以上15歳未満	1錠		合成ケイ酸アルミニウム	300mg	制酸作用に持続性があり、胃粘膜の保護作用があります。
				11歳未満	服用しないこと		沈降炭酸カルシウム	300mg	緩慢な制酸作用と吸着作用があります。
				<用法・用量に関する注意> (1) 用法・用量を厳守してください。 (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。			炭酸水素ナトリウム	1950mg	過剰な胃酸をすばやく中和します。
							センブリ末	30mg	胃部不快感・食欲不振など慢性的に衰えた胃腸機能の回復のための苦味健胃生薬です。
							ゲンチアナ末	30mg	
							添加物:カルメロースCa、タルク、ステアリン酸		
英語	Ikenjyou	Quick relief for the uncomfortable symptoms such as acid indigestion, heart burn, excessive drinking alcohol requires a fast cure. Binding the mucoprotein in the stomach lining and providing a protective coating that soothes irritation and provides fast relief. The compounded crude drug will activate your digestive process.	Hyperchlorhydria, heartburn, epigastric distress, sense of abdomen distension, stomach heaviness, belching, nausea (Churning of stomach, Hangover, Drunken sickness), vomiting, too much drinking, stomach pain, inappetence anorexia, overeating	Take the following dosage in 30 minutes after meal, use water without chewing.	6 tablets(Adult daily usage)		【Side effects or any adverse events may occur by not following the direction.】 ① Following people should not take this medicine. Do not take if you are undergoing dialysis treatment. ② Do not take for extended periods. 〔What to ask〕 1. Please consult with your physician, pharmacist or registered sales clerks if you are: (1)Currently under a doctor's care. (2)People diagnosed as follows: Kidney Disease, Dysfunction Thyroid. 2. After taking this medicine, the following symptoms may occur. If the symptoms continue or enhance stop taking it immediately. Consult with your physician, pharmacist, or registered sales clerks. constipation, diarrhea 3. If your condition persists more than 2 weeks, stop taking this medicine. Please take this product instruction to consult with your physician, pharmacist, or registered sales clerks.	(1) Store them in a cool, low humidity area avoiding from a direct sunlight. (2) Keep it away from small children. (3) Don't replace the product to a different container. (It may cause accidental ingestion and quality deterioration.) (4) Do not take expired products. (5) Please throw away the fillings inside the container after it's opened. (Fillings are packed to avoid tablets' corruption.) Revised on August 2012 (Description change)	
				Age	Usage	Daily usage			Active Ingredient
				Adult(over 15)	2 tablets	3 times	Magnesium Aluminometasilicate	300mg	Stabilize acidity level. Binding the mucoprotein in the stomach lining.
				11 ~ under 15	1 tablets		Synthetic Aluminum Silicate	300mg	Continue to control the antacid action, protects the stomach lining.
				under 11	Do not use		Precipitated Calcium Carbonate	300mg	Contains slack antacid action and absorption.
				<Dosing and Administration.> 1. Please follow the dosing and administration. 2. For small children, take under the adults' guidance and supervision.			Sodium Bicarbonate	1950mg	Neutralizes excessive gastric acid.
							Powdered Swertia Herb	30mg	A bitter stomach herbal medicine healing decayed stomach activities such as chronic epigastric distress anorexia・epigastric distress
							Powdered Gentian	30mg	
							Additives: Carmellose calcium, talc, stearic acid		