

	商品名	商品説明	効能・効果	用法・用量	成分・分量	使用上の注意	保管および取扱い上の注意
日本語	龍角散せき止め液 ベリコンS	龍角散のせきどめ液〔ベリコンS〕は、せき中枢にはたらい、せきの発作を抑え気管支をひろげてせきをしずめます。またアレルギー性のせきや、たんを伴うせきにもすぐれた効果をあらわします。夜中の急なせきや、がんこなたんもすばやく抑える。大人1回1本飲みきりのシロップ剤です。	せき、たん	・大人(15歳以上)1回量10ml(1本)、15歳未満は服用しないこと。 ・通常1日4回、毎食後および就寝前に服用すること。 ・場合により、6回まで服用して差し支えないが、その場合は原則として約4時間の間隔をおいて服用すること。 <用法・用量に関する注意> (1)用法・用量を厳守してください。	60mL(大人1日量)中 成分 ジヒドロコデインリン酸塩 30mg dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg ノスカピン塩酸塩水和物 45mg ジプロピリン 120mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg 無水カフェイン 75mg グアイフェネシン 225mg セネガ流エキス(原生薬換算量) 0.9ml(900mg) 添加物:白糖、サッカリンNa、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、エタノール、黒糖フレーバー、エチルパニリン、香料	〔してはいけないこと〕 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。高熱、排尿困難 (6)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 関係部位 症状 皮膚 発疹・発赤、かゆみ 消化器 吐き気・嘔吐、食欲不振 精神神経系 めまい 循環器 動悸 泌尿器 排尿困難 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 <症状の名称> 再生不良性貧血 <症状> 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 <症状の名称> 無顆粒球症 <症状> 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 便秘、口のかわき、眠気 4.5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。) (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。 (5)本剤は生薬成分を配合していますので沈殿を生じることがありますが、効力に変わりません。よく振ってから服用してください。 2011年10月改訂 (記載要領変更に伴う改訂)
英語	Ryukakusan Cough Medicine(Syrup) "Belicon S"	Ryukakusan's Cough Medicine(Syrup)[Belicon S] works on the cough center to widen the airway. It is also effective for the allergic coughs or cleaning out phlegm. It gives a relief from hacking coughs at night, or persistent coughs promptly. Take one bottle for single use.	Cough, phlegm	・Adult(over 15) Single use amount 10ml(1 bottle) Under 15 years old do not use. ・4 times a day is allowed to take, take after meals and before sleeping. ・Depending on the symptom you may take 6 times per day. Wait 4 hours before the next use. <Dosing and Administration.> 1. Please follow the dosing and administration.	60mL(Adult daily usage) Active Ingredient Dosage Dihydrocodeine Phosphate 30mg dℓ-Methylephedrine Hydrochloride 45mg Noscapine Hydrochloride Hydrate 45mg Diprophylline 120mg Chlorpheniramine Maleate 12mg Anhydrous Caffeine 75mg Guaifenesin 225mg Senega Fluid Extract (Original Herbal Reduced Quantity) 0.9ml(900mg) Additives: Sucrose, Saccharin Sodium Hydrate, D-sorbitol, Citric Acid, Sodium Citrate, Paraben, Ethanol, Brown Sugar Flavor, Ethyl Vanillin, Perfume	1 Please consult with your physician, pharmacist or registered sales clerks if you are: (1) Currently under a doctor's care. (2)People who are pregnant or having a possibility of pregnancy. (3)Elderly people (4)Experienced any allergy reactions by taking any medication. (5)Having a high fever, dysuria (6)People diagnosed as follows: Heart Disease, Hypertension, Diabetes, Glaucoma, Dysfunction thyroid, Epilepsy. 2. If you have the following reactions to the product, discontinue use immediately. Take this product instruction to consult with your physician, pharmacist, or registered sales clerks. <Symptoms> Skin: Rash, skin reddening, itchiness, Digestive system: nausea, vomiting, inappetence anorexia Nervous system: Dizziness Circulatory Organ: Palpitation Urinary system: Dysuria <Name of the symptom> Aplastic anemia <Symptom> Bruise, nasal bleeding, gum bleeding, fever, pale skin, feebleness, heart palpitation, short breath, feeling dizzy, bloody urine. <Name of the symptom> agranulocytosis <Symptom> Sudden high fever, shivering, throat pain 3. After taking this medicine, the following symptoms may occur. If the symptoms continue or enhance stop taking it immediately. Consult with your physician, pharmacist, or registered sales clerks. constipation, oral dryness, sleepiness 4. If your condition persists after usage of 5 to 6 times, stop taking this medicine. Please take this product instruction to show, and consult with your physician, pharmacist, or registered sales clerks.	(1)Store them in a cool, low humidity area avoiding from a direct sunlight. (2)Keep it away from small children. (3)Don't replace the product to a different container. (It may cause accidental ingestion and quality deterioration.) (4)Don't take expired products. (5)Before using this product, a deposition might happen in an effect of containing crude medicine. Shake well before using. Revised on October, 2011 (Description change)