

OTC 医薬品の服薬状況は
 おくすり手帳で管理し、
 必要に応じて医師・薬剤師に
 申告してください。

医薬品名	リスク区分	成分	用法・用量
龍角散	第3類医薬品	キキョウ末、 キョウニン末、 セネガ末、 カンゾウ末	大人（15歳以上） 1回1杯（0.3g）、 1日3～6回、 水なし服用

カンゾウ1日量 50mg

医薬品名	リスク区分	成分	用法・用量
龍角散ダイレクト スティックミント	第3類医薬品	キキョウ末、 セネガ末、 カンゾウ末、 キョウニン、 ニンジン末、 アセンヤク末	大人（15歳以上） 1回1包 1日6回服用、 服用間隔は2時間 以上おくこと、 水なし服用

カンゾウ1日量 102mg

医薬品名	リスク区分	成分	用法・用量
龍角散ダイレクト スティックピーチ	第3類医薬品	キキョウ末、 セネガ末、 カンゾウ末、 キョウニン、 ニンジン末、 アセンヤク末	大人（15歳以上） 1回1包 1日6回服用、 服用間隔は2時間 以上おくこと、 水なし服用

カンゾウ1日量 102mg

医薬品名	リスク区分	成分	用法・用量
龍角散ダイレクト トローチ マンゴーR	第3類医薬品	キキョウ末、 キョウニン、 セネガ末、 カンゾウ末	大人（15歳以上） 1回1錠 1日3～6回服用 服用間隔は2時間 以上おくこと、 口中でかまずに ゆっくり溶かす

カンゾウ1日量 50mg

切り取って、おくすり手帳に貼り付けてください。