龍角散ダイレクトスティックミント・ピーチ/RYUKAKUSAN DIRECT Stick Mint・Peach

	商品説明	効能・効果	用法•用量			成分•分量		使用上の注意	保管および取扱い上の注意
日本語	龍角散ダイレクトスティックミント・ピーチは、のどのあれ・不快感をやわらげるお薬です。いつでもどこでも、水なしで服用できる顆粒タイプなので、生薬成分が患部に直接作用します。スティック 1 包が大人 1 回服用分ですが、3 歳のお子様からどなたにもご使用いただけます。龍角散ダイレクトスティックミント・ピーチは、のどの粘膜に直接作用して効果を発揮します。水で胃に流し込むと効果が弱くなりますので、水なしでお飲みください。龍角散ダイレクトスティックミント・ピーチは顆粒状ですが、お口の中であわ雪のようにさっと溶け、のどに直接すばやく作用します。龍角散ダイレクトスティックミントは▼印から開けてください。	たん、せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感	次の量を水なしで服用してください。 服用間隔は2時間以上おいてください。			6 包(4.2g、大人 1 日量)中		相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に 保管してください。
			年齢 1回量 1日服	1 日服用回数	成分	含量		(2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因	
			大人(15 歳以上)	1包	6回 -	キキョウ末	84.0mg	(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3)高熱の症状のある人。 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って、医師、薬剤師又は登録	になったり品質が変わることがあります)。 (4)1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。 (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
			11 歳以上 15 歳未満	2/3 包		セナガ末	4.2mg		
			7歳以上11歳未満	1/2 包		カンゾウ末	102.0mg		
			3歳以上7歳未満	1/3 包		キョウニン	15.0mg		
			3 歳未満	服用		ニンジン末	84.0mg		
			<服用方法>			アセンヤク末	8.4mg	販売者に相談してください。 関係部位/症状	
			舌の上に薬をおき、ゆっくり溶かすようにしながら、のどに運んでください。 〈用法・用量に関する注意〉 (1)用法・用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。			〈ミント〉 添加物: バレイショデンプン、 スリトール、クエン酸、ℓ-メント 色 5 号、青色 1 号	無水ケイ酸、エリ ・一ル、香料、黄	皮膚/発疹・発赤、かゆみ 消化器/吐き気・嘔吐、食欲不振 精神神経系/めまい	
						<ピーチ> 添加物: バレイショデンプン、 ン酸Mg、エリスリトール、フマトール、香料、 赤色 102 号		3.5~6 日服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。	
	Product Discription	Indications	Dosage and Administration			Ingredients	3	Precaution for use	Precautions for storage and handling
	RYUKAKUSAN DIRECT Stick Mint is a medicine which can sooth irritable and uncomfortable throat conditions. It is made into granule type, so you can take anytime anywhere without water. The active ingredients directly work on the affected area. One stick is a dose for adult, and it is available for children over 3 years. RYUKAUSAN DIRECT Stick Mint works directly on the throat mucus membrane. Due to the effects of the medicine by taking with water will be suppressed, take it without water.	Cough, phlegm, or hoarseness, irritation, and discomfort of the throat caused by inflammation.	Take as directed below, without water. Leave at least 2 hours between doses.			6 sticks (4.2g, usual daily dose for adults) contain the following:		What to ask a doctor, pharmacist or registered OTC drug seller 1. Ask a doctor, pharmacist or registered OTC	(1) Store in a cool, low humidity area avoiding from a direct sunlight.(2) Keep out of reach from children.
			Age	Single Dose	Doses per Day	Active ingredients	Dosage	drug seller before use. (1) Currently under a doctor's care. (2) Having ever had allergic reaction to any medicines. (3) Do not replace (It may cause misure (4) In the case of upackage, fold the broad upackage, fold the b	(3) Do not replace the product to another containers. (It may cause misuse and deterioration in the quality)
			Adult (over 15)	1stick	6 -	Powdered Platycodon root	84.0mg		 (4) In the case of use the rest of divided from sealed package, fold the bag and store it in a dry place, preferably used up within 2 days. (5) Do not use this product after its validity date has expired.
			11 to 14	2/3stick		Powdered Senega	4.2mg		
			7 to 10	1/2stick		Powdered Glycyrrhiza	102.0mg		
			3 to 6	1/3stick		Apricot Kernel	15.0mg		
			under 3	Do	not use	Powdered Ginseng	Powdered Ginseng 84.0mg this product instruction to consult with your physician, pharmacist, or registered OTC drug		
英語			<how take="" to=""> Put medicine on your tongue ,and slowly dissolve it toward</how>		Powdered Gambir	8.4mg	seller.		
	Tear it open RYUKAKUSAN DIRECT stick Mint at the ▼mark. RYUKAKUSAN DIRECT Stick Mint is granular but melts like snow in your mouth and acts directly on your throat quickly.		throat. <precautions administration.="" and="" dosage="" for=""> 1. Always follow the dosage and administration instructions carefully. 2. This product should only be given to children when under the guidance and supervision of an adult.</precautions>			<mint> Other ingredients: Potato starch, anhydrous silicic acid, erythritol, citric acid, L-menthol, flavoring agent, food yellow no.5, and food blue no.1 <peach> Other ingredients: Potato starch, magnesium aluminometasilicate, erythritol, sodium fumarate, L-menthol, flavoring agent, and food red no. 102.</peach></mint>		Related areas / Symptoms Skin / rash, itchiness, skin reddening Digestive system / nausea, vomiting, loss of appetite Nervous system / dizziness 3. If your condition persists more than 5 to 6 days, stop taking this medicine. Please take this product instruction to show, and consult with your physician, pharmacist or registered OTC drug seller.	