## 龍角散ダイレクトトローチマンゴーR/RYUKAKUSAN DIRECT Lozenge Mango Flavor R

	商品説明	効能·効果	用法・用量			成分•分量		使用上の注意	保管および取扱い上の注意
日本語	龍角散ダイレクトトローチマンゴを開発を配合した唯一のトローチです。「のどがイガブ」すなどです。「のどがイガブ」すなどでです。「かまずにゆってが、かまずにゆってに溶かすようがのが、まずにであると、生薬成分がのので、で、直接作用し、かます。マウムだではからで、ない。生薬が、まず、では、の働きを回りとメントールをでで、対しているので、大に散りばめているので、大に散りばめる間、、清涼感とがりよりで、変やかな味のトローチです。。	炎症による声がれ・ のどのあれ・のどの 不快感・のどの痛 み・のどのはれ	・次の量を服用してください。 ・ロ中に含み、かまずにゆっくり溶かすように服用してください。 ・服用間隔は2時間以上おいてください。			6錠(大人1日の服用量)中		相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師の治療を受けている人。	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因に
			年齢	1 回量	1 日服用回数	成分	分量	(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある 人。 - (3)高熱の症状のある人。	なったり品質が変わることがあります)。 (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
			大人(15 歳以上)	1 錠	3~6 回	キキョウ末	70.0mg		
			5 歳以上 15 歳未満	1/2 錠	5.40回	キョウニン	5.0mg		
			5 歳未満 服用しないこと			セナガ末	3.0mg	2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してくださ	
			<用法・用量に関する注意> (1)用法・用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3)かみ砕いたり、飲み込んだりしないでください。			カンゾウ末	50.0mg		
						添加物:無水ケイ酸、クエン酸、D-ソルビトール、ステアリン酸 Mg、ゼラチン、グリセリン、リボフラビン、&-メントール、香料  <成分に関する注意> トローチ表面の斑点は原料によるもので、品質には問題ありません。		い。 関係部位/症状 皮膚/発疹・発赤、かゆみ 消化器/吐き気・嘔吐、食欲不振 精神神経系/めまい 3.5~6日服用しても症状がよくならない場合は服用を 中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販 売者に相談してください。	
英語	Product Discription	Efficacy	Dosage and Administration			Ingredients		Precaution for use	Precautions for storage and handling
	RYUKAKUSAN DIRECT Lozenge Mango Flavor R is the only troche which contains fine powder crude medicine. When you have a sore or irritable throat from yelling or other causes, just put it in your mouth and let it melt without chewing. Active herb ingredients work to stimulate direct to the mucous membrane on your weakened throat and recovery. The Micro bead which contains Mango flavor and menthol is dispersed in the troche is available to work maintaining refreshing and aromatic for long time in your mouth. It is a fresh taste troche.	Cough, phlegm, or hoarseness, irritation, discomfort, pain, or swelling of the throat caused by inflammation.	Take as directed below. Dissolve the lozenge slowly in the mouth. Do not chew. Leave at least 2 hours between doses.			6 tablets (usual daily dose for adults) contain the following:		What to ask a doctor, pharmacist or registered OTC drug seller.  1. Ask a doctor, pharmacist or registered OTC drug seller before use.	<ol> <li>Store in a cool, low humidity area avoiding from a direct sunlight.</li> <li>Keep out of reach from children.</li> <li>Do not replace the product to another containers. (It</li> </ol>
			Age	Single Dose	Doses per Day	Active ingredients	Dosage	(1) Currently under a doctor's care. (2) Having ever had allergic reaction to any medicines. (3) Having a high fever.  (4) ex  2. If you have the following reactions to the product, discontinue to use immediately. Take this product	may cause misuse and deterioration in the quality)  (4) Do not use this product after its validity date has expired.
			Adult (over 15)	1tablet	3 to 6	Powdered Platycodon	70.0mg		
			5 to 14	1/2 tablet		Apricot kernel	5.0mg		
			Under 5	Do	not use	Powdered Segana	3.0mg		
			_	Precautions for Dosage and Administration.>		Powdered Glycyrrhiza	50.0mg	instruction to consult with your physician, pharmacist, or registered OTC drug seller.	
			Always follow the dosage and administration instructions carefully.     This product should only be given to children when under the guidance and supervision of an adult.     Do not chew or swallow whole.			Other ingredients: Anhydrous silicic acid, citric acid, D-sorbitol, magnesium stearate, gelatin, glycerin, riboflavin, L-menthol, and flavoring agent. <notice ingredients="" to=""> Specks on the surface of the lozenge are due to the raw ingredients and do not affect the quality of the product.</notice>		Related areas / Symptoms Skin / rash, itchiness, skin reddening Digestive system / nausea, vomiting, loss of appetite, Nervous system / dizziness  3. If your condition persists more than 5 to 6 days, stop taking this medicine. Please take this product instruction to show, and consult with your physician, pharmacist or registered OTC drug seller.	